

CASSANESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:09 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:04



Sinonimi: Grossa di Cassano

Diffusione: Areale della piana di Sibari (Cosenza)

Caratteri biologici ed agronomici:

Epoca di maturazione: Novembre-Dicembre

Produttività: Buona

Compatibilità: Autosterile

Resistenza: Occhio di Pavone

Sensibilità: Mosca

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL FRUTTO

Caratteri morfologici

Drupa

Endocarpo

Colore della raccolta

Nero-Violaceo

Invaiatura

Tardiva

Forma

Ovoidale-sferoidale

Ovoidale

Simmetria

Simmetrica

Simmetrico

Posizione diametro max.

Centrale

Centrale

Dimensione

Grande

Grande

Forma dell'apice

Arrotondato

Conica

Forma della base

Arrotondata

Arrotondata

Epicarpo

Pruinoso

Superficie

Rugosa

Terminazione dell'apice

Dati biometrici medi

□□□□□□ Peso 100 noccioli

CASSANESE

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:09 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:04

gr. 60