

ROGGIANELLA

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06



Sinonimi: Rotondella, Roggianese, Vernile, Tondina

Diffusione: Provincia di Cosenza

Caratteri biologici ed agronomici:

Epoca di maturazione: Novembre

Produttività: Alta

Compatibilità: Autosterile

Resistenza: media alla mosca

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE DEL FRUTTO

Caratteri Morfologici

Drupa

Endocarpo

Colore della raccolta

ROGGIANELLA

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Rosso-vinoso

Nero-violaceo

Invaiatura

Media

Forma

Sferoidale

Ovoidale

Simmetria

Simmetrica

Simmetrico

Posizione diametro max.

Centrale

Apicale

Dimensione

Media

Grande

Forma dell'apice

Arrotondato

Arrotondata

Forma della base

Arrotondata

ROGGIANELLA

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Arrotondata

Epicarpo

Pruinoso

Superficie

Liscia

Terminazione dell'apice

Dati biometrici medi

ROGGIANELLA

Scritto da Administrator

Venerdì 01 Maggio 2009 15:11 - Ultimo aggiornamento Giovedì 14 Maggio 2009 18:06

Peso 100□ noccioli

gr. 68